

01096600-0910

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Canifug® Lösung 1 %**

0,01 g Clotrimazol pro 1 ml Lösung

Liebe Patientin, lieber Patient, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Canifug Lösung 1 % jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Canifug Lösung 1 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Canifug Lösung 1 % beachten?
3. Wie ist Canifug Lösung 1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Canifug Lösung 1 % aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Canifug Lösung 1 % und wofür wird es angewendet?

Canifug Lösung 1 % ist eine gegen Pilze wirkende Lösung zur Anwendung auf der Haut. Canifug Lösung 1 % wird angewendet bei Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere wie Malassezia furfur. Diese können sich äußern als Mykosen der Füße, Mykosen der Haut und der Hautfalten, Pityriasis versicolor, oberflächliche Candidosen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Canifug Lösung 1 % beachten?**Canifug Lösung 1 % darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Clotrimazol, Propylenglycol oder einen der sonstigen Bestandteile von Canifug Lösung 1 % sind (siehe Abschnitt 6 „Weitere Informationen“).
- während der Stillzeit im Brustbereich.

Anwendung bei Kindern und älteren Personen

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig, da bei Anwendung von Canifug Lösung 1 % keine vermehrten oder verstärkten Nebenwirkungen bekannt geworden sind.

Bei Anwendung von Canifug Lösung 1 % mit anderen Arzneimitteln

Durch den Wirkstoff Clotrimazol vermindert Canifug Lösung 1 % die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Frühschwangerschaft (1. bis 3. Monat) sollte Canifug Lösung 1 % aus Vorsicht nicht angewendet werden, da sich aus einer Studie Hinweise auf eine erhöhte Fehlgeburt rate ergeben haben, wenn in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft Clotrimazol-haltige Arzneimittel in der Scheide angewendet wurden. Während der Stillzeit darf Canifug Lösung 1 % nicht im Brustbereich angewandt werden, um zu verhindern, dass der Säugling geringe Wirkstoffmengen beim Stillen aufnimmt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Canifug Lösung 1 %

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist Canifug Lösung 1 % anzuwenden?

Wenden Sie Canifug Lösung 1 % immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.


Canifug Lösung 1 % ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Canifug Lösung 1 % 2- bis 3-mal täglich dünn auf die erkrankten Hautstellen aufgesprüht.

Bei jeder Anwendung verfahren Sie bitte wie folgt:

- Ziehen Sie die durchsichtige Verschlusskappe vom Sprühkopf ab.
- Drücken Sie den Sprühkopf vor der ersten Anwendung mehrmals herunter, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht. Bei den weiteren Anwendungen ist dann das Präparat sofort gebrauchsfertig.
- Bringen Sie die Flasche in einen Sprühabstand von 10–30 cm von der erkrankten Hautstelle. Je nach Anwendungsort kann die Flasche mit dem Sprühkopf nach unten oder oben gehalten werden (s. Abbildung).

- Drücken Sie bei jeder Anwendung 1- bis 2-mal auf den Sprühkopf. Diese Menge ist auch bei großflächigen Pilzkrankungen ausreichend.



- Reiben Sie die aufgetragene Lösung in die Haut ein.
- Setzen Sie anschließend die Verschlusskappe wieder auf den Sprühkopf.
- Befindet sich die Pilzkrankung an den Füßen (sog. Fußpilz), so sollten die Zehenzwischenräume nach dem Waschen gründlich abgetrocknet werden.

Dauer der Anwendung

Wichtig für einen Erfolg der Behandlung ist die regelmäßige und ausreichend lange Anwendung der Lösung.

Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich und hängt u. a. ab vom Ausmaß und der Lokalisation der Erkrankung.

Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Symptome oder subjektiven Beschwerden abgebrochen werden, sondern bis zu einer Behandlungsdauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden. Pityriasis versicolor heilt im Allgemeinen in 1–3 Wochen ab. Bei Fußpilz sollte, – um Rückfällen vorzubeugen – trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiter behandelt werden.

Wenn Sie eine größere Menge Canifug Lösung 1 % angewendet haben als Sie sollten

Setzen Sie die Behandlung beim nächsten Mal mit der normalen Menge fort.

Wenn Sie die Anwendung von Canifug Lösung 1 % vergessen haben

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie nicht die doppelte Menge von Canifug Lösung 1 % an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Menge wieder auf.

Wenn Sie die Anwendung von Canifug Lösung 1 % abbrechen

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker die weitere Vorgehensweise, da der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Canifug Lösung 1 % Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bedeutame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie

Canifug Lösung 1 % nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10 000) sind allergische Reaktionen gegen Clotrimazol, Propylenglycol, Macrogol 400 oder gegen einen der sonstigen Bestandteile von Canifug Lösung 1 % möglich.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1 000) können Hautirritationen (z. B. vorübergehende Rötung, Brennen, Stechen) vorkommen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Canifug Lösung 1 % aufzubewahren?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern. Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch: Bis zum auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfallsdatum.

6. Weitere Informationen

Was Canifug Lösung 1 % enthält:

Der Wirkstoff ist Clotrimazol.

1 ml Lösung enthält 0,01 g Clotrimazol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogol 400, 2-Propanol (Ph. Eur.), Propylenglycol.

Wie Canifug Lösung 1 % aussieht und Inhalt der Packung:

Canifug Lösung 1 % ist eine klare dünnflüssige Lösung in Glasflaschen mit einem Sprühverschluss aus Kunststoff.

Die Packungen enthalten 30 ml und 50 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Telefon: (0521) 8808-05

Fax: (0521) 8808-334

E-Mail: info@wolff-arzneimittel.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2010.

DR·WOLFF